

Soulager la douleur des enfants : quel médicament à quel moment ?

PRÉVENIR LA DOULEUR PROVOQUÉE PAR LES SOINS CHEZ L'ENFANT : QUEL MÉDICAMENT À QUEL MOMENT ? VERSION 2022

Fin d'administration du médicament ■ Je ne fais plus le soin ■ Je pense faire le soin

MÉDICAMENTS ANTALGIQUES

MÉDICAMENT	VOIE	à partir de	à quel moment ?	Surveillance	PIC D'ACTION
MÉMO	RESPIRATOIRE	1 mois	À administrer tout le temps que dure le soin. Si l'indication est intermittente plus de 48 heures, attendre le prochain soin. Si le délai prévisible de soins est supérieur à 60 minutes, se poser la question d'une AIG.		1
MORPHINE MORPHIOL FOR	VOIE ORALE	à partir de 6 mois	D'un biberon et EVA prioritaire de soins > 6	Surveillance étroite avant 1 an	1 h
	VOIE INTRA-VENEUSE	dès la naissance	5 minutes de perfusion. D'un biberon et EVA prioritaire de soins > 6		10'
					2 h
TRAMADOL	VOIE ORALE	à partir de 3 ans	Contra-indiqué pour les pathologies respiratoires, compris pour les plus grands		2 h
	VOIE INTRA-VENEUSE	à partir de 15 ans	20 minutes de perfusion. Si trop rapide : risque de vomissements		10'
					1 h
PARALYTIQUE	VOIE INTRA-VENEUSE	à partir de 18 mois	Analogue et sédatif. Perfuser lentement car effet pleurost.	20 minutes de perfusion.	10'
	VOIE RECTALE	à partir de 8 mois	Prévoir un effet sédatif. Voir notice = absorption et durée d'action variables.		20'
					1 h

ANESTHÉSIOLOGIQUES LOCAUX

MÉDICAMENT	VOIE	à partir de	à quel moment ?	Surveillance	PIC D'ACTION
LIDOCAÏNE	TRANSCUTANÉE	dès la naissance	Profondeur d'application : 1 à 2 applications - 3 cm / 2 h d'application - 5 cm		1 h
	ORALE	à partir de 12 ans	Prévoir un effet sédatif. Voir notice = absorption et durée d'action variables.		2 h
					1 à 2 h
LIDOCAÏNE	GEL BUCCAL	dès la naissance	Si nécessaire, compléter l'injection superficielle par une injection plus profonde.		3'
	SPRAY	à partir de 0-12 mois	Prévoir un effet sédatif. Voir notice = absorption et durée d'action variables.		3'
					15'
					15'

SOLUTIONS SUCRÉES - SUCCION NON NUTRITIVE

MÉDICAMENT	VOIE	à partir de	à quel moment ?	Surveillance	PIC D'ACTION
GLUCOSE / SACCHAROSE	ORALE	à partir de 4 mois	Effet analgésique grâce à la succion non nutritive. Administration répétée nécessaire si soin attendu de 5 minutes. Allaitement ou sein = action déprélevante.		2'
					5'

AUTRES MÉDICAMENTS

MÉDICAMENT	VOIE	à partir de	à quel moment ?	Surveillance	PIC D'ACTION
INDOLOLAN	VOIE ORALE	à partir de 6 mois	Analogue à associer avec carbimé.		30'
	VOIE RECTALE	à partir de 6 mois	Prévoir un effet sédatif. Voir notice = absorption et durée d'action variables.		10'
	VOIE INTRA-VENEUSE	à partir de 6 mois	Prévoir un effet sédatif. Voir notice = absorption et durée d'action variables.		10'
					1 h
KÉTAMINE	VOIE INTRA-VENEUSE	à partir de 6/12 mois	Utiliser à faible dose. Prévoir un effet sédatif. Voir notice = absorption et durée d'action variables.		2'
					10'

AUTRES MOYENS

MÉDICAMENT	VOIE	à partir de	à quel moment ?	Surveillance	PIC D'ACTION
FROID	APPLICATION LOCALE	à partir de 3 ans	30 secondes avant l'effraction cutanée.		0,5'
					1'
FROID	APPLICATION LOCALE	à partir de 3 ans	Dispositif BUZZY®		0,5'
					3' à 10' selon soin

Ces médicaments doivent être associés systématiquement à des moyens non-médicamenteux : une information sur le déroulement du soin, l'installation confortable de l'enfant, la présence des parents...

VERSION 2022



Scannez le QR code

www.sparadrap.org