

Evaluation de l'anxiété préopératoire de l'enfant

A remplir à l'admission, en service d'hospitalisation.

Date :

Etiquette d'hospitalisation
de l'enfant

Niveau d'anxiété du parent à l'admission :

père mère

élevé
moyen
peu élevé
inexistant

Parent accompagnant :

oui non

Si oui :
père mère

Anxiété du parent au départ de l'enfant au bloc :

père mère

élevé
moyen
peu élevé
inexistant

L'enfant a-t-il vécu de précédentes séparations : oui non

Comment c'est passé la séparation ?	très difficilement	plutôt difficilement	assez facilement	très facilement	ne sait pas
1ère garde par un baby-sitter ponctuel (non-membre de la famille)					
entrée à la crèche					
entrée à la halte garderie					
entrée à l'école maternelle					
entrée à l'école primaire					
départ pour la première colonie					

Observations particulières :

Score d'anxiété préopératoire "YALE"

A remplir au bloc opératoire par une IADE ou une IBODE de préférence à l'insu de l'enfant, à l'installation de l'enfant sur la table d'opération.
Entourer un chiffre pour chaque activité.

ITEMS	NOTE
A. ACTIVITE	
1. Regarde autour de lui, curieux, peut explorer les objets, ou reste calme	1
2. N'explore pas, peut regarder vers le bas, peut remuer nerveusement les mains ou sucer son pouce (son doudou)	2
3. Se tortille, bouge sur la table, peut repousser le masque	3
4. Tente activement de s'échapper, repousse avec les pieds et les mains, peut bouger tout le corps	4
B. VOCALISATIONS	
1. Pose des questions, fait des commentaires, babille	1
2. Répond aux questions des adultes mais à voix basse, « baby talk », ou ne fait que des signes de tête	2
3. Silencieux, aucun son, ne répond pas aux adultes	3
4. Pleurniche, se plaint, gémit	4
5. Pleure, peut crier « non »	5
6. Pleure et crie de façon continue (audible continuellement à travers le masque)	6
C. EXPRESSION EMOTIONNELLE	
1. Manifestement heureux, souriant	1
2. Neutre, pas d'expression faciale visible	2
3. Inquiet (triste) ou effrayé ; yeux effrayés, tristes, ou pleins de larmes	3
4. En détresse, pleure, totalement bouleversé, peut avoir les yeux écarquillés	4
D. ETAT D'VEUIL APPARENT	
1. Alerte, regarde occasionnellement autour de lui, observe ce que l'anesthésiste lui fait	1
2. Renfermé sur lui-même, tranquillement assis, peut sucer son pouce, ou visage tourné vers l'adulte	2
3. Vigilant, regarde rapidement tout autour de lui, peut sursauter aux bruits, yeux grands ouverts, corps tendu	3
4. Etat de panique, pleurniche, peut pleurer ou repousser les autres, se détourne	4
TOTAL	/18

Prémédication : oui
non

Type :
.....

1ère opération : oui
non

si non combien :
.....

à quel(s) âge(s) :
.....

Observations particulières :